


NEONATO

Sequenza del PBLS (Paediatric Basic Life Support)




4 Valutazione della funzione cardiaca

Nel neonato, il collo è particolarmente corto e ricco di grasso, per cui l'arteria carotide risulta difficilmente apprezzabile. Per questa ragione nel bambino da 0 a 1 anno, se necessario valutarlo (es. dopo rianimazione) si ricerca il polso dell'arteria brachiale.

Essa scorre sulla faccia interna del braccio, subito davanti all'omero. Bisogna quindi:

- Divaricare un braccio del neonato;
- Porre la punta d'indice e medio sul lato interno, poco sopra la piega del gomito, senza esercitare una pressione eccessiva;
- Ricercare la presenza di pulsazioni per almen o 10 secon di.



Stabilito l'arresto cardiaco (non risponde, non respira e non si muove allo stimolo) occorre ricercare il punto di compressione per iniziare il massaggio cardiaco.

- Porre i polpastrelli d'indice, medio ed anulare di una mano sulla metà inferiore dello sterno, con l'indice verso la testa, sulla linea congiungente i capezzoli ("linea intermammaria");

- Sollevare l'indice ed eseguire 5 compressioni profonde solo 1,5-2 cm con la punta di medio e anulare;



Alternare 5 compressioni e 1 insufflazione.

Schema riassuntivo sequenza PBLS NEONATO

VALUTAZIONE PERICOLI AMBIENTALI

A. VALUTAZIONE DELLO STATO DI COSCIENZA

Se il neonato/bambino non risponde urlare per chiamare aiuto
(NON ALLONTANARSI). Posizionarlo.

MANTENERE LA PERVIETÀ' DELLE VIE AEREE
(iperestensione moderata della testa)

B. VALUTAZIONE DELL' ATTIVITA' RESPIRATORIA

Manovra GAS per 10 secondi

Se il respiro è PRESENTE mantenere la pervietà delle
vie aeree e somministrare ossigeno, ricontrollando ogni
minuto i parametri vitali.

Se il respiro è ASSENTE
effettuare 5 lente insufflazioni
con Ambu; se non disponibile,
Bocca-bocca naso nel neonato

C. VALUTAZIONE DELL' ATTIVITA' CARDIACA

(Mo.To.Re)

Per 10 secondi valutare: polso brachiale, respiro, tosse,
movimenti e colorito

SE ASSENTI

effettuare 1 minuto di PBLS (circa 12 cicli)
(PBLS 5:1 nel neonato)
rivalutare e allertare 118

Disostruzione delle vie aeree pediatrico

Le tecniche necessarie per disostruire un neonato cosciente sono le seguenti:

1. Pacche interscapolari o dorsali

- Posizionare il neonato a pancia in giù sul proprio avambraccio, con le gambe a cavalcioni del gomito e la testa più bassa del resto del corpo;
- Appoggiare l'avambraccio sulla coscia;
- Dare 5 colpi tra le scapole con il palmo della mano;
- Girare il neonato e controllare il cavo orale; se non si sono ottenuti risultati efficaci, procedere con le compressioni toraciche.

